

Sortni poskus/Variety trial
Jablje

Prejšnji posevek: ozimna pšenica

Datum setve: 11.09.2008

Setvena količina: 20 kg/ha, medvrstna razdalja 15 cm

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 6 m²

Gnojenje v tretjem letu rabe: 160 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

Število košenj: 3 (11.05., 05.07., 14.09.)

Navadna pasja trava/Cocksfoot
Dactylis glomerata

Previous crop: winter wheat

Date of sowing: 11.09.2008

Seed rate: 20 kg/ha, interrow spacing 15 cm

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 6 m²

Fertilization in third year: 160 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

Number of cuttings: 3 (11.05., 05.07., 14.09.)

SORTA VARIETY	Izvor Origin	Prezimitev Winter hardiness	Začetek latenja Heading date	Višina rastlin 1 košnje Plant height 1st cut	Odpornost proti boleznim Resistance to disease	Odpornost proti boleznim-jesen Resistance to disease- autumn	SB/CP		NEL/NEL		2011		2009 - 2011		
							Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Pridelek zelinja Herbage yield	Rodnostna skupina Yield category	Povprečni pridelek zelinja Average herbage yield	Povprečna relativna vrednost pridelka zelinja Average relative herbage yield	
		1-9 1=zelo dobra very good	datum date	cm	1-9 1=zelo dobra very good	1-9 1=zelo dobra very good	g/kg SS g/kg DM	kg/ha	MJ/kg SS MJ/kg DM	000 MJ/ha	t/ha (SS) t/ha (DM)		t/ha (SS) t/ha (DM)	%	
Ereva	F 8	2,0	-	35	3,0	2,0	85	940	6,07	66,9	11,02	II/2	11,46	110	
Bepro	PL 6	2,0	7.5.	50	1,0	5,0	90	985	5,68	62,1	10,93	II/2	10,15	97	
Trerano	D 34	1,5	3.5.	55	2,5	6,0	95	985	5,52	57,2	10,37	II/3	9,72	93	
Povprečje/Mean											10,77		10,44	100	
LSD (0,05)											0,66				